Recherche des anticorps de la Nodopathie Auto-immune
Anti-Neurofascine 155, anti-PanNeurofascine, anti-CNTN1, anti-CASPR1

Identité du patient (Nom, Prénom) : Date de naissance :

Trigger	□ Oui préciser :
Mode d'installation	□ Premier épisode □ Rechute n° ... □ Début des symptômes de la maladie : _ _ / _ _ / _ _ □ Début des symptômes de la rechute actuelle : _ _ / _ _ / _ _ □ Installation aigu (< 1 mois) □ Subaigu ([1-2] mois) □ Chronique (> 2 mois)
Clinique SNP	□ Présentation □ Symétrique □ Asymétrique □ Déficit moteur □ MS □ proximal □ MI □ proximal □ distal □ distal □ Amyotrophie □ MS □ proximal □ MI □ proximal □ distal □ distal □ AROT □ MI □ MS □ Hypoesthésie / Paresthésies □ MI □ MS □ MI> MS □ MS≥MI □ Ataxie proprioceptive (Romberg présent) □ Ataxie spino-cérébelleuse (Tandem difficile/impossible) □ Tremblement □ Atteinte des paires crâniennes □ oculomoteur □ V □ facial □ bulbaire □ Douleurs radiculaires □ Douleurs neuropathiques (distales) □ Dysautonomie □ Atteinte respiratoire □ Synthèse clinique □ GBS □ PRNC typique □ Lewis Sumner □ PRNC ss □ PRNC motrice □ PRNC Focale
	□ ENMG démyélinisant □ axonal □ équivoque □ normal □ Dissociation albumino cytologique à la PL □ Rehaussement / hypertrophie des racines sur l'IRM médullaire □ Atteinte centrale clinique et/ou IRM □ NORB □ Atteinte rénale Protéinurie des 24 h = □ Autre :
Scores fonctionnels	ONLS MS /5 ONLS MI /7 RODS = mRS = Marche sur 10 mètres (secondes) :

Traitement :	Efficace	Inefficace	Non testé	Dépendant
Corticoïdes	□	□	□	□
IVIg	□	□	□	□
Echanges	□	□	□	□
Anti-CD20	□	□	□	□
Autres : ……	□	□	□	□

□ **Rechute sans traitement**

□ **Rechute sous traitement (s)**

Lequel :				
Date introduction				
Quelle dose :				

□ **Si rechute sous anti-CD20**
Taux de CD19/CD20 mm^3 :
Anticorps anti-Rituximab : □ oui □ non □ non dosé

□ **Anticorps impliqués dans la Nodopathie Autoimmune déjà recherchés** □ oui □ non
Si présents (dates) :
Anticorps anti- : □ NFasc155 □ PanNFasc □ CNTN1 □ CAPSR1
Isotypes : □IgG1 □ IgG2 □ IgG3 □ IgG4
Titre en ELISA :

Modalités d'envoi :

- **Nature du prélèvement : 2mL de sérum décanté adressé à 4°C**

- **Adresse d'envoi :**

A l'attention du Dr Alexandre Jentzer
Site Unique de Biologie
Réception, Tri, Enregistrements et Envois Extérieurs (RT3E)
Service d'Immunologie
371 avenue du doyen Gaston Giraud
34295 Montpellier cedex 5

Pour tout renseignement : Adresser un mail à **a-jentzer@chu-montpellier.fr**