



PROTOCOLE POUR CLAIRANCE FECALE DE L'ALPHA-1-ANTITRYPSINE

Intérêt

Déterminer l'évolutivité d'affections inflammatoires chroniques de l'intestin et en suivre le traitement.

Composés dosés, types de tubes utilisés & bon de demande


Analyse effectuée : Alpha-1-antitrypsine

Tubes et pots utilisés : - 1 tube sec avec gélose 7 ml JAUNE pour le sang
 - 3 pots à selles

Bons de demande utilisés : bon de biochimie (rose)

Protocole

Pas de régime spécial pour le patient



Transport

- Noter le **jour de prélèvement** sur le tube de sang, sur chaque pot de selles et sur le bon de demande
- Indiquer le poids des selles de 24h sur chaque pot.
- Envoyer le tube de sang et les 3 pots des selles de 24h à température ambiante à l'accueil de biologie du site.

Date d'application : 24.6.13

TABLEAU D'APPROBATION

	POUR LE GROUPE D'ELABORATION	VALIDATION (fonction qualité)	AVIS EXPERT (facultatif)	APPROBATION (responsable d'activité)	
Nom :	E PEUCHANT	E CHAUZIT	I COMBOURIEU	H de VERNEUIL	S POMMIERS
Fonction :	Pilote du processus prescription	RAQ	Pilote du processus prélèvement, transport, réception	Chef de service de biochimie	Cadre supérieur de santé
Date :	3/05/2013	3 juin 2013	3 juin 2013	5 juin 2013	3 juin 2013
Signature :					