CONSIGNES RECUEIL MICTION DES URINES - UNITES SOINS

A l'attention des services prescripteurs :

Cette instruction concerne le recueil des urines sur MICTION pour les examens suivants :

- **Les électrophorèses des protéines urinaires - CUELP**

Recherche sang
Dosage de : créatinine, protéines totales, albumine, alpha-1-microglobuline, IgG => rendu des résultats par rapport à l'excrétion de la créatinine
Electrophorèse des protéines urinaires, évaluation de ou des anomalie(s) monoclonale(s)
Interprétation : typage de la protéinurie

- **Marqueurs tubulaires – CUTUB**

Dosage de : créatinine, alpha-1-microglobuline, bêta-2-microglobuline => rendu des résultats par rapport à l'excrétion de la créatinine
Interprétation

- **Typage de la protéinurie – CUTYP**

Dosage de : créatinine, protéines totales, albumine, alpha-1-microglobuline, IgG => rendu des résultats par rapport à l'excrétion de la créatinine
Interprétation : typage de la protéinurie

Ce document a été réalisé selon les recommandations de la SFBC (Ann. Biol. Clin. 2018 ;76(6) :609-16)

Matériel nécessaire :



- Récipient pour urines **sans additif** (flacon avec canule intégrée +/- tube à bouchon beige)

Recueil :

- A l'attention du patient :

1 – ne pas réaliser de toilette intime





Date d'application : 09/06/2023

TABLEAU D'APPROBATION

	POUR LE GROUPE D'ELABORATION	VALIDATION (fonction qualité)	AVIS EXPERT (facultatif)	APPROBATION (responsable d'activité)	
Nom	BERARD ANNIE	DARTIGUELONGUE HELENE		CHARPENTIER ELENA	POMMIERS SYLVIE
Signature	DOCUMENT VALIDE NUMERIQUEMENT				

- Fermer hermétiquement le pot bleu
- Homogénéiser les urines par retournements
- Transfert des urines dans le tube spécifique à l'aide de la canule intégrée au flacon

→ le pot bleu sert au recueil de l'urine, il ne doit JAMAIS être envoyé au laboratoire

Transport :

Les tubes remplis doivent **être identifiés et acheminés au laboratoire entre 2°C et 8°C**

