CHU BDX – CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BORDEAUX	**Entité d'application :** PBP - CHU - Autres prelevements **Emetteur :** PBP - P1B - VIR	**IN_LAB_23_1351** Ind : 01
	INSTRUCTION	Page : 1/1

PRELEVEMENT SALIVAIRE DU NOUVEAU-NE EN VUE D'UNE PCR CMV

DOCUMENT QUALITE MAITRISE – POLE BIOLOGIE ET PATHOLOGIE

1. Prélever la salive <u>après 24h de vie</u> et <u>au moins 1h après la tétée</u>.
2. Vérifier l'absence de lait dans la bouche du nouveau-né. Si besoin éliminer le lait avec une compresse stérile. Cette étape est importante car le lait maternel peut contenir du CMV et l'analyse serait alors faussée.
3. Utiliser l'un des milieux de transport proposés ci-dessous et un écouvillon floqué.



∑-Virocult (bouchon vert)

∑-Transwab (bouchon violet)

Copan UTM (bouchon rouge)

Xpert Viral Transport Medium (bouchon rouge)



4. Appliquer l'écouvillon dans la face interne de la joue du nouveau-né pendant environ 20 à 30 secondes jusqu'à ce qu'il soit imbibé de salive.
5. Insérer l'écouvillon à l'intérieur du tube dans le milieu de transport et le casser pour fermer le tube.
6. Mettre l'étiquette patient du nouveau-né sur le tube.

V 2023 02 17, d'après CNR HERPESVIRUS

Date d'application : 20/03/2023

TABLEAU D'APPROBATION					
	POUR LE GROUPE D'ELABORATION	**VALIDATION** (fonction qualité)	**AVIS EXPERT** (facultatif)	**APPROBATION** (responsable d'activité)	
Nom	**GARRIGUE ISABELLE**	**REYGNER EMILIE**	**CHARPENTIER ELENA**	**TUMIOTTO CAMILLE**	**POMMIERS SYLVIE**
Signature	**DOCUMENT VALIDE NUMERIQUEMENT**				