ASSURANCE QUALITE

INSTRUCTION POUR PRISE EN CHARGE D'UN CHOC ANAPHYLACTIQUE

GRADE I : Signes cutanéomuqueux généralisés : érythème, urticaire avec ou sans angioedème.

GRADE II : Atteinte multiviscérale modérée avec signes cutanéomuqueux, hypotension et tachycardie inhabituelles, hyperréactivité bronchique (toux, difficulté ventilatoire).

GRADE III : Atteinte multiviscérale sévère menaçant la vie et imposant un traitement spécifique ; collapsus, tachycardie ou bradycardie, troubles du rythme cardiaque, bronchospasme. Les signes cutanés peuvent être absents ou n'apparaître qu'après la remontée tensionnelle.

GRADE IV : Arrêt circulatoire et / ou respiratoire



Quoi ? Quand ? Comment ?

TEMPS 0 :
AU MOMENT DU CHOC OU DÈS QUE POSSIBLE

✔ 1 tube EDTA (bouchon violet) : dosage de l'histamine

✔ 1 tube sec (bouchon rouge ou jaune) : dosage de la tryptase, des IgE spécifiques

JOINDRE LE QUESTIONNAIRE MÉDICAL

TEMPS 1 :
+ 2 HEURES APRÈS T0

✔ 1 tube sec (bouchon rouge ou jaune) : dosage de la tryptase

TEMPS 2 :
+ 24 HEURES APRÈS T0

✔ 1 tube sec (bouchon rouge ou jaune) : dosage de la tryptase

Les prélèvements doivent être APPORTÉS SANS DÉLAI au laboratoire (pas de coursiers) dans une poche +4°C. Le transport rapide s'effectue à température ambiante.

PELLEGRIN : 2ème étage du Tripode, PLATEAU TECHNIQUE À RÉPONSE RAPIDE
de 6h30 à 19h30 Accueil de Biologie Centralisé, poste 15546
de 19h30 à 6h30 Laboratoire de garde, poste 70270

SAINT-ANDRÉ : 2ème étage, bât. LABORATOIRE RÉPONSE RAPIDE
24h/24h, poste 95837

HAUT-LÉVÊQUE : hôpital cardiologique, PLATEAU TECHNIQUE À RÉPONSE RAPIDE,
24h/24h, poste 75710

Secondairement : tests cutanés (4 à 6 semaines après)

Unité d'Allergologie Hôpital Pellegrin Dr GUEZ, Dr BORDES-DEMOLIS, Dr PELLERIN

✔ Prise de RDV : soit au poste 95 541
soit faxer au 94 804 la feuille d'anesthésie, les coordonnées du médecin et du patient : le secrétariat vous contactera.

Version du 15avril 2011 - Pôle anesthésie-réanimation, Consultations Allergologie, Laboratoire Immunologie