TEST SYNACTHENE FAIBLE DOSE CHEZ L'ADULTE

But du test

Stimuler la fonction surrénalienne à la recherche d'une insuffisance surrénalienne.

Substance(s) administrée(s) & voie(s) d'administration

SYNACTHENE® immédiat (Tétracosactide) - ampoule à 250 µg – A diluer de la façon suivante :

Préparation de la solution - Dilution à 1 µg :


- Prendre une poche de 250 mL de soluté de NaCl 9 ‰
- Enlever 1 mL de soluté à la poche
- Reconstituer 1 ampoule de Tétracosactide avec son solvant et l'injecter dans la poche de NaCl
- Homogénéiser la préparation
- Prélever **1 mL** dans une seringue *(la concentration finale est de 1µg/mL)*

Composés dosés, types de tubes utilisés & bon de demande

Analyses pouvant être effectuées : Cortisol
Tubes utilisés : Voir catalogue des actes
Bon de demande utilisé : Hormonologie et Marqueurs Tumoraux - Epreuves dynamiques

Protocole

Réaliser le test de préférence le matin entre 8h et 9h mais il peut être réalisé à tout moment de la journée.
Le patient ne doit pas avoir pris d'hydrocortisone 12 heures avant le test et doit être au repos depuis 30 min afin de minimiser les phénomènes de stress.



Noter les temps de prélèvement sur les tubes et sur le bon de demande.
Acheminer tous les tubes à la fin du test à **température ambiante**.

Effets secondaires & contre-indications

Néant

Remarques

Etre précis dans la dilution du Synacthène®.
Cocher l'heure de réalisation du test sur la demande

Date d'application : 09/05/2022

TABLEAU D'APPROBATION					
	POUR LE GROUPE D'ELABORATION	**VALIDATION** (fonction qualité)	**AVIS EXPERT** (facultatif)	**APPROBATION** (responsable d'activité)	
Nom	**CORCUFF JEAN-BENOIT**	**LAURO CINDY**	**COMBOURIEU ISABELLE**	**GEORGES AGNES**	**DECONZANET SABINE**
Signature	**DOCUMENT VALIDE NUMERIQUEMENT**				