BONNES PRATIQUES DE PRESCRIPTION DE LA TROPONINE IC HAUTEMENT SENSIBLE


Le diagnostic d'un syndrome coronarien aigu (SCA) chez un patient présentant une douleur thoracique repose sur la convergence du contexte clinique avec les données électrocardiographiques et les marqueurs biologiques. La troponine Ic hautement sensible est un paramètre majeur dans le diagnostic des SCA ST- où l'ECG n'est pas contributif.

De très faibles concentrations de troponine Ic circulante sont mesurées et les seuils décisionnels (99ème percentile) dépendent du sexe :

- Chez la femme de 20 à 75 ans ≤ 16 ng/L
- Chez l'homme de 20 à 75 ans ≤ 34 ng/L

Toute valeur supérieure à 5 fois le seuil (80 ng/L pour la femme et 170 ng/Lpour l'homme) nécessite une prise en charge cardiologique immédiate.

Dans les autres cas, un deuxième prélèvement 3 heures plus tard est indispensable. Une augmentation significative de la TnIC est en faveur d'une suspicion de SCA alors qu'une valeur stable doit faire rechercher d'autres causes d'élévation de la troponine (myocardite, insuffisance cardiaque, embolie pulmonaire ….)



Date d'application : 26/07/2018

TABLEAU D'APPROBATION					
	POUR LE GROUPE D'ELABORATION	**VALIDATION** (fonction qualité)	**AVIS EXPERT** (facultatif)	**APPROBATION** (responsable d'activité)	
Nom :	**LACAPE GENEVIEVE**	**CHAUZIT EMMANUELLE**	**BATS MARIE-LISE**	**BERARD ANNIE**	**POMMIERS SYLVIE**
Signature :	**DOCUMENT VALIDE NUMERIQUEMENT**				

SEULE LA VERSION ELECTRONIQUE FAIT FOI, ASSUREZ-VOUS DE LA BONNE VERSION EN VIGUEUR

BONNES PRATIQUES DE PRESCRIPTION DE LA TROPONINE IC HAUTEMENT SENSIBLE